

Muelas del juicio

Las muelas del juicio, o terceros molares, son los últimos dientes que se desarrollan. La mayoría de las personas tienen cuatro muelas del juicio, una en cada extremo de la boca. En general aparecen durante los últimos años de la adolescencia o poco después de cumplir los veinte años.

Con frecuencia, las muelas del juicio quedan atrapadas o incrustadas en el hueso de la mandíbula, o sencillamente no emergen. Esto puede causar el amontonamiento o el desplazamiento de otros dientes, o favorecer el desarrollo de caries dentales localizadas, infección, o enfermedad de las encías. Las muelas del juicio incrustadas se ubican en el hueso mandibular en posiciones extrañas, a veces horizontalmente, lo que impide que emerjan en forma normal.



Retención ósea angular del tercer molar (muela del juicio).



Retención en el tejido blando del tercer molar.

En la mayoría de los casos, se recomienda extraer la muela del juicio retenida. Dependiendo de la posición de la muela, la extracción del tercer molar o de la muela del juicio podrá realizarse en el consultorio del dentista, en una instalación quirúrgica ambulatoria o en un hospital.

PROCEDIMIENTO HABITUAL



Se realiza una incisión, y se extrae el tejido blando excedente y el hueso, dejando expuesta la corona del diente retenido.



La muela se extrae entera o se corta quirúrgicamente en piezas grandes, que se pueden extraer por separado si no es posible extraer la muela entera de una vez. Se cierra el área suturando.

Si la muela no está retenida, la extracción es idéntica a la de cualquier otro diente.

Para aliviar cualquier malestar y favorecer la cicatrización:

- Coloque bolsas de hielo sobre la mejilla para reducir la inflamación, aplicándolas durante 30 minutos y descansando otros 30.
- Aplique presión mordiendo una gasa limpia colocada sobre la sutura para detener la hemorragia
- Coma alimentos blandos y beba mucho líquido
- Evite los alimentos duros o crujientes en el área dolorida

Llega hasta usted gracias a

Crest **Oral-B**

Salud bucal profesional de P&G

- Cepílese con cuidado el día siguiente a la cirugía
- Tome los medicamentos recetados y siga todas las instrucciones
- Evite el uso de pajitas para beber a fin de retener el coágulo sanguíneo en la cavidad de la muela
- Su dentista puede recomendarle que use un enjuague terapéutico

Llame a su dentista o a su médico de inmediato si sangra en forma excesiva, tiene mucha inflamación, le duele en forma persistente o intensa, o tiene fiebre.

Asegúrese de seguir las instrucciones especiales de cuidado en el hogar suministradas por su dentista.

Llega hasta usted gracias a

Crest. Oral-B®

Salud bucal profesional de P&G